

30. PARO CARDIORRESPIRATORIO

INSTRUCCIONES PRE-ARRIBO

PROCEDIMIENTO DE RCP

1. CONSERVE LA CALMA, le voy a dar unas instrucciones importantes
2. Si hay un desfibrilador en el lugar o cerca del lugar mande a alguien a traerlo
3. ¿Alguien presente sabe RCP? Si es así ¿requiere que le recuerde los pasos correctos?
4. En caso negativo inicie el RCP y estaré pendiente en la línea en caso de que me requiera.
5. En caso positivo o si no hay alguien que sepa RCP acerque el teléfono a donde está el paciente.
6. Coloque a la víctima en el piso o sobre una superficie firme
7. Arrodílese a un lado de la persona y proporcione compresiones en el pecho de manera rápida y profunda. Tiene que presionar una tercera parte del tórax:
 - a. Coloque ambas manos sobre el esternón de la persona justo entre los 2 pezones si es adulto.
 - b. Coloque una mano si es un niño mayor de un año pero es pequeño de tamaño.
 - c. Coloque 2 o 3 dedos sobre el esternón en el centro del pecho entre los pezones en niños menores de 1 año
 - d. PRESIONE FUERTE, PRESIONE RÁPIDO Y PERMITA QUE SE EXPANDA EL TÓRAX, NO INTERRUMPA LAS COMPRESIONES.
8. Continúe así hasta que llegue la ambulancia o traigan un Desfibrilador.
9. Yo permaneceré en la línea todo este tiempo en caso de que tenga una duda.

USO DEL DESFIBRILADOR

1. Si llega el desfibrilador, enciéndalo.
2. Coloque los parches en el pecho del paciente como muestran los diagramas en los parches y si es necesario conéctelo
3. Espere a que el equipo analice el ritmo. Si indica dar una desfibrilación verifique que nadie toque al paciente y presione el botón que indica.
4. Si ya dio la descarga o indica no darla y el paciente sigue inconsciente inicie las compresiones tal como se le indicó. Continúe hasta que el desfibrilador se lo indique y repita los pasos anteriores.
5. Yo permaneceré en la línea todo este tiempo en caso de que tenga alguna duda.

Nota: si alguien en la escena sabe dar RCP y se trata de una víctima pediátrica es importante que dé RCP con ventilaciones si es posible. Estimúlelo a hacerlo.

CRITERIOS PARA SUSPENDER RCP EN LA ESCENA

Unidad que Responde es de Soporte Básico de Vida	Unidad que Responde es de Soporte Avanzado de Vida
<ul style="list-style-type: none"> • El paro no es presenciado por un profesional del SEM ni por un primer respondiente • No se restablece la circulación espontánea después de 3 ciclos completos de RCP y análisis del DEA • No se han administrado descargas del DEA 	<ul style="list-style-type: none"> • El paro no es presenciado por ninguna persona • Ningún testigo presencial practica la RCP • No se restablece la circulación espontánea después de finalizar los cuidados de SVA in situ • No se han administrado descargas